

## ESCLARECIMENTOS ACERCA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID19

### A VACINA IDEAL

Primeiramente, vale a pena enfatizar que não existe uma vacina que seja melhor que a outra; todas as que estão sendo aplicadas foram rigorosamente avaliadas seguindo critérios estabelecidos pelos Órgão governamentais responsáveis e estão habilitadas a conferir imunidade desde que respeitados o esquema vacinal em número de doses e intervalo entre elas.

### DISPONIBILIDADE

Considerando o quantitativo limitado da vacina, foram estabelecidos grupos prioritários para a vacinação que seguiram critérios como risco para morbimortalidade, manutenção do funcionamento dos serviços de saúde e de serviços essenciais. Desta forma, os municípios estão divulgando no site das respectivas prefeituras, o calendário de vacinação para os grupos de risco segundo as diretrizes do Ministério da Saúde que está contemplando, na fase atual, idosos, trabalhadores de saúde da linha de enfrentamento da COVID 19, idosos, pessoas com deficiência institucionalizadas e população indígena vivendo em terras indígenas.

Para saber mais sobre a possibilidade de agendamento pode-se consultar o site do município de residência. Em Recife o [conectarecife.recife.pe.gov.br](http://conectarecife.recife.pe.gov.br). Em Olinda, acessar a página correspondente à Prefeitura de Olinda e em Jaboatão acessar o endereço [deolhonaconsulta.jaboatao.pe.gov.br](http://deolhonaconsulta.jaboatao.pe.gov.br).

### INDICAÇÃO

Em princípio a vacina está indicada para todos os indivíduos acima de 18 anos de idade mesmo que tenham tido a doença.

Portadores de doenças com uso de medicação especial, gestantes, nutrizes e puérperas NÃO devem tomar a vacina sem antes consultar o médico assistente que fará a devida análise risco/benefício da vacinação.

Em caso de doença febril em curso, a vacina também não poderá ser aplicada, devendo ser adiada até a resolução completa do quadro.

Caso o indivíduo esteja com quadro sugestivo de COVID 19 em atividade, a vacinação só deverá ocorrer após a recuperação clínica total e, idealmente, ao menos 4 semanas após o início dos sintomas.

Paciente assintomático mas com PCR positivo para COVID 19 deverá respeitar o intervalo de 4 semanas a partir da coleta do PCR.

### EFEITOS COLATERIAS

Com relação aos efeitos colaterais apresentados até o presente, eles não diferem daqueles decorrentes de outras vacinas comumente utilizadas, podendo ocorrer mais comumente dor no local da aplicação, febre e dor no corpo.

Qualquer reação de maior gravidade, caso ocorra, deve ser imediatamente comunicada ao serviço onde a vacina foi administrada.

## **EFICÁCIA**

A eficácia não é de 100% e varia de indivíduo para indivíduo, mas é esperado que após a segunda dose da vacina desenvolva-se uma quantidade de anticorpos suficientes para evitar a forma grave da doença. Independentemente do número de doses e da data de aplicação da vacina, **TODAS AS MEDIDAS DE BIOSEGURANÇA DEVERÃO SER MANTIDAS** tais como o distanciamento social, o uso de máscaras, a higiene das mãos com água e sabão e álcool gel.

## **DOAÇÃO DE SANGUE**

Indivíduos vacinados deverão ser considerados inaptos **temporariamente** para doação de sangue:

Por 48 horas após cada dose da vacina SINOVA/BUTANTAN

Por 7 dias após cada dose da vacina ASTRAZENECA/ FIOCRUZ.